

Pogona (Agame barbu)

Pogona vitticeps

🇬🇧 Central bearded dragon 🇩🇪 Bartagame

NAC+Vet



RÉGLEMENTATION

Non soumis à CITES

OPAn: exigences minimales pour reptiles diurnes (UVB obligatoire, gradient thermique, dimensions d'enclos). Tenue d'un registre conseillé; lâcher interdit. Vente professionnelle soumise aux règles de compétence (OPAn-OFEV).



ESPÉRANCE DE VIE

8-10 ans



POIDS ADULTE

300-500 g



TAILLE ADULTE

38-60 cm



MODE DE VIE

Semi-désertique, semi-arbore, diurne



TEMPÉRATURE CORPORELLE

Ectotherme / Poikilotherme



MATURITÉ SEXUELLE

0.5-1.5 ans



INCUBATION

21-42 jours



TAILLE DE PORTÉE

10-40 œufs



Habitat & environnement

Type — Terrarium spacieux, sec et fortement éclairé en UVB. Deux zones thermiques obligatoires (point chaud / point froid). Matériaux faciles à nettoyer et qui retiennent la chaleur (verre, plastique, plexiglas). Aération bilatérale indispensable (façade + côtés ou arrière).

Substrat — Sandmat Exoterra®, papier ménager ou papier journal. Éviter sable et terre (occlusion intestinale).

Sorties — Grande surface au sol pour ramper, branches pour grimper, sorties surveillées hors terrarium en environnement sécurisé.



Équipement

- Branches/racines pour grimper et faire du basking
- Cachettes côté chaud et côté froid
- Pierre plate sous la lampe pour la digestion
- Aération latérale (façade ou côtés)
- Écuelle d'eau peu profonde (peu utilisée)
- Pipette/seringue pour hydrater 2-3x/semaine
- Bain hebdomadaire/douche douce tiède



À éviter

- Plaques chauffantes intra-terrarium
- Pierres chauffantes (hot rocks)
- Tapis chauffants à l'intérieur du terrarium
- Lampes sans grille de protection (risque de brûlure)



Paramètres techniques



Point chaud

35-40 °C

Point de basking; pierre plate ou branche sous la lampe.



Point froid

20-25 °C

Zone fraîche; température nocturne identique (pas de chauffe la nuit).



Humidité

30-40 %

Sec; ventilation suffisante pour éviter condensation.



Éclairage



Photopériode — 14 h/jour



Besoin UVB — Vital

 **Type d'ampoule** — Halogénure métallique avec ballast externe (UVB + chaleur combinés)

 **Marques recommandées** — X-Reptile · Reptile Expert · Solar Raptor · Arcadia

 **Renouvellement** — 1×/an (halogénure) — tubes UV classiques tous les 6 mois (UVB s'épuise avant la lumière visible)

 Les UVB ne traversent ni le verre ni le plexiglas. Placer la lampe à l'intérieur du terrarium, sous grille de protection.

 Les lampes à vapeur métallique sont la référence pour l'apport en UV : spectre UVB puissant, supérieur aux néons et lampes compactes, optimisant la synthèse de vit. D et l'absorption du calcium. Réduisent le risque de maladie osseuse métabolique; lumière visible intense et chaleur homogène stimulant l'activité.

Comportement

Lézard généralement docile, curieux, capable de comportements de communication marqués: hochements de tête (head-bobbing) chez le mâle dominant, mouvements circulaires d'un bras (arm-waving) chez la femelle ou le subordonné, gonflement de la « barbe » noire en cas de stress ou de parade.

 **Vie sociale** — Espèce solitaire à l'état adulte. Cohabitation mâle/mâle interdite (combats, blessures graves). Couple 1 mâle / 1 femelle: risque d'épuisement de la femelle. 2 femelles ou 1 mâle / 2 femelles tolérés avec un volume de terrarium augmenté (+30 %), des zones de basking multiples et une surveillance constante.

 **Cycle d'activité** — Diurne; activité maximale en milieu de journée pendant la phase de basking. Sommeil nocturne dans une cachette ou perché sur une branche.

Enrichissement

- Chasse d'insectes vivants (proies mobiles)
- Aménagement vertical varié: branches, racines, paliers de basking
- Sorties hors terrarium surveillées en environnement sécurisé
- Bain hebdomadaire ou douche tiède douce
- Variétés de légumes et présentation en petits tas dispersés

Alimentation

Omnivore opportuniste; régime évoluant avec l'âge. Bébé (<5 mois): 60–80 % insectes. Adultes: 60–80 % végétaux. Règles clés: taille des proies ≤ largeur de la tête entre les yeux (risque de paralysie/occlusion); insectes nourris (« gut-loading » 24–48 h avec légumes riches en Ca, fruits, granulés spécifiques) avant distribution, sinon valeur nutritionnelle effondrée; varier les sources pour couvrir vitamines et minéraux.

Régime de base

Grillon

Base protéique; saupoudrer de calcium

Crique

Base protéique; bien accepté, faible en chitine

Blatte

Riches en protéines, faible en lipides; bonne option de base

Ver de soie

Très digestes, riches en calcium et faibles en lipides

Légumes & légumes

Privilégier les légumes à rapport Ca/P élevé et riches en vitamine A. Hacher finement, varier les sources, retirer les restes après 12 h.

Pissenlit

Ca/P 5.2 Vit A

Excellent (Ca/P ~5,2); riche en vitamine A

Joubarbe

Ca/P 3

Très bon rapport Ca/P (~21)

Trèfle

Ca/P 5

Bon rapport Ca/P (~6,6)

Luzerne

Ca/P 5.5

Bon rapport Ca/P (~6,1); à modérer (riche en protéines)

Roquette

Ca/P 4 Vit A

Bon Ca/P (~4,6); riche en vitamine A

Cresson

Ca/P 3.5 Vit A

Très riche en vitamine A (~422 000 UI/kg MS)

Endive

Ca/P 1.8 Vit A

Verdure de base, bien acceptée

Chicorée frisée

Ca/P 2.5 Vit A

Verdure de base; amertume bien tolérée

Scarole

Ca/P 2.3 Vit A

Verdure de base, alternative à la chicorée

Laitue romaine

Ca/P 2 Vit A

Riches en vitamine A (~274 000 UI/kg MS)

Fane de navet

Ca/P 4.5 Vit A

Bon Ca/P, à varier

Chou chinois

Ca/P 3.5

À varier, en petites quantités

Persil

Ca/P 3.3

Herbe aromatique, en petite quantité

Basilic

Ca/P 1.2

Herbe aromatique, en petite quantité

Courgette

Ca/P 0.7

Légume hydratant; en complément, pas en base

Friandises (occasionnelles)

Friandises occasionnelles, en petites quantités. Insectes gras et sourceaux: à limiter pour éviter surpoids et stéatose hépatique.

Ver de farine

Riches en chitine et en lipides; 1–2×/sem. max.

Ver Morio

Plus gras encore; à limiter strictement

Ver de ruche

Très gras; uniquement en récompense ponctuelle

Sourceau

Très calorique; ponctuel chez l'adulte, jamais comme base

Hydratation

L'écuelle d'eau est rarement utilisée. Privilégier un abreuvement à la pipette (gouttes sur le museau) 2-3×/sem., un bain tiède hebdomadaire (eau à hauteur des coudes, ~20 min) ou une douce pulvérisation des verdure. Les verdure fraîche couvrent une grande partie des besoins hydriques.

Vitamine A

Vitamine A essentielle pour les muqueuses, la peau et la vision. Privilégier les source naturelle (verdure vert foncé, cresson, pissenlit, persil, romaine) plutôt que des suppléments. Carence: paupières gonflées (« puffy eye »), dysecdysie, infection récurrentes.

FRÉQUENCE

- Bébés (<5 mois): 3 repas/jour (60-80 % insectes); ex. 9 h: 4 grillons; 12 h: légumes hachés; 17 h: 1 vers à soie + 2 grillons
- Juvéniles (5-18 mois): 1 repas/jour, transition progressive vers la part végétale
- Adultes: quotidien (60-80 % végétaux), insectes 2-3×/semaine
- 1 jour de jeûne/semaine chez l'adulte pour limiter l'obésité

RAPPORT CALCIUM/PHOSPHORE (CA/P)

Indicateur clé de l'équilibre minéral d'un aliment, surtout chez les reptiles : un ratio favorable au calcium soutient le squelette et la carapace. Repères : ≥ 2 = adéquat · 1-2 = à modérer · < 1 = à éviter (favorise la maladie osseuse). Sur les insectes, une poudre de calcium au repas corrige un ratio défavorable.

À ÉVITER

Aliments toxiques, fortement déséquilibrés ou à risque parasitaire. À proscrire totalement.



Avocat

Toxique (persine); cardiotoxique et hépatotoxique



Rhubarbe

Très riche en oxalates; néphrotoxique



Aubergine

Solanine; potentiellement toxique



Jonquille

Toxique (alcaloïdes)



Tulipe

Toxique (tuliposides)



Azalée

Très toxique (grayanotoxines)



Luciole

Mortel (lucibufagines, même en très petite quantité)



Chenille

Risque toxicologique (poils urticants, alcaloïdes)



Papillon

Souvent toxiques (alcaloïdes des plantes hôtes)



Proies sauvages

Proies sauvages non contrôlées (parasites, pesticides)



Santé & prévention



Médecine préventive

Examen clinique annuel (état général, mues, cavité buccale, abdomen, masse), pesée régulière (suivi de la courbe de poids), analyse coproscopique 1×/an (parasites internes), renouvellement annuel des lampes UVB, contrôle du gradient thermique et de l'hygrométrie, bain hebdomadaire pour l'hydratation cutanée.



Vaccination

Aucune vaccination de routine.



Chirurgie & stérilisation

Chirurgies courantes: ovariectomie en cas de dystocie (rétention d'œufs), exérèse de masses cutanées/abdominales, extraction de corps étrangers digestifs, débridement et fermeture de plaies, amputation partielle de queue (nécrose), correction de prolapsus (cloacal, hémipénis).



Pathologies fréquentes



SIGNES D'ALERTE

- Léthargie persistante, prostration au point froid
- Anorexie > 7 jours (hors brumation)
- Perte de poids, queue qui s'amincit
- Anomalies des selles (diarrhée, sang, parasites visibles)
- Difficultés de mue (dysecdysie), peau qui colle aux orteils/queue
- Déformations osseuses, mâchoire molle, fractures pathologiques (MBD)
- Tremblements, convulsions (hypocalcémie aiguë)
- Respiration bouche ouverte hors basking, jetage, sifflements
- Gonflement abdominal, dystocie (femelle gravide qui ne pond pas)
- Prolapsus cloacal, hémipénis non rétracté
- Lésions cutanées brunes/jaunes croûteuses (mycose)

En présence de l'un de ces symptômes, une prise en charge rapide est essentielle. Contactez dès que possible un vétérinaire spécialisé NAC.

Maladie osseuse métabolique (MBD)

SYMPTÔMES Mâchoire molle, déformations osseuses, fractures spontanées, tremblements, faiblesse, prostration

CAUSE Carence en UVB et/ou en calcium, rapport Ca/P alimentaire trop bas, manque de vitamine D3

PRÉVENTION UVB 10–12 % renouvelé annuellement, supplémentation calcique régulière, légumes à Ca/P élevé

Dystocie / rétention d'œufs

SYMPTÔMES Femelle gravide léthargique, abdomen distendu, contractions inefficaces > 48 h, anorexie

CAUSE Absence de site de ponte adéquat, hypocalcémie, œufs trop volumineux, obésité, déshydratation

PRÉVENTION Bac de ponte (sable/terreau humide) dès maturité, calcium adéquat, condition corporelle optimale, suivi vétérinaire

Parasitose interne (coccidies, oxyures)

SYMPTÔMES Diarrhée, perte de poids malgré un appétit conservé, retard de croissance chez le jeune

CAUSE Recontamination par les selles, hygiène insuffisante, stress, surpopulation

PRÉVENTION Coproscopie annuelle, nettoyage régulier des selles, quarantaine des nouveaux individus

Atadénovirus (BDPV / agamid adenovirus)

SYMPTÔMES Mortalité juvénile, hépatite, retard de croissance, anorexie, parésie

CAUSE Transmission horizontale (selles) et verticale; porteurs asymptomatiques fréquents

PRÉVENTION Quarantaine ≥ 90 jours avec PCR cloacale, biosécurité stricte, élimination des élevages contaminés

Yellow Fungus Disease (Nannizziopsis guarroi)

SYMPTÔMES Plaques cutanées jaunes/brunes croûteuses, ulcérations profondes, nécrose, extension systémique

CAUSE Champignon kératinophile opportuniste, terrain immunodéprimé, hygrométrie inadaptée

PRÉVENTION Hygiène stricte, quarantaine des nouveaux individus, gestion du stress et de l'hygrométrie

Brûlures thermiques

SYMPTÔMES Lésions ventrales/dorsales bien délimitées, mues incomplètes sur la zone, infection secondaire

CAUSE Pierres chauffantes, plaques/tapis chauffants intra-terrarium, lampes sans grille

PRÉVENTION Source de chaleur hors d'atteinte, grille de protection, gradient thermique externe au substrat

Dysecdyse (mue retenue)

SYMPTÔMES Lambeaux de peau retenus sur orteils/queue, nécrose distale possible (anneau de mue)

CAUSE Hygrométrie trop basse, carence en vitamine A, déshydratation, parasites externes

PRÉVENTION Bain hebdomadaire, hygrométrie correcte, légumes riches en vitamine A, peignage doux des restes

Stomatite ulcéreuse (« mouth rot »)

SYMPTÔMES Dépôt caséux dans la bouche, gencives hémorragiques, hypersalivation, anorexie

CAUSE Stress, traumatisme buccal, hygiène insuffisante, immunodépression

PRÉVENTION Hygiène du terrarium, paramètres thermiques corrects, contrôle buccal régulier



Encore plus d'infos sur nacvet.ch

La fiche en ligne est mise à jour régulièrement et propose des contenus enrichis : nouvelles photos, recommandations actualisées, articles de conseil. Scannez ce code pour accéder directement à la version web de cette fiche.



Accédez à la fiche en ligne — nacvet.ch/species/bearded-dragon

