

Gecko à crête

Correlophus ciliatus

 Crested gecko  Kronengecko

NAC+Vet



RÉGLEMENTATION

Non soumis à CITES

OPAn: exigences minimales pour geckos arboricoles (hauteur d'enclos, cachettes, humidité). Détention individuelle possible mais socialisation prudente; registre conseillé.



ESPÉRANCE DE VIE
15-20 ans



POIDS ADULTE
35-45 g



TAILLE ADULTE
18-20 cm



MODE DE VIE
Semi-arboricole,
nocturne /
crépusculaire



TEMPÉRATURE CORPORELLE
Ectotherme /
Poikilotherme



MATURITÉ SEXUELLE
10-18 mois



INCUBATION
60-90 jours



TAILLE DE PORTÉE
2-2 œufs



Habitat & environnement



Type — Terrarium tropical humide, en verre ou plexiglas (matériaux faciles à nettoyer qui conservent la chaleur). Une aération de chaque côté du terrarium est essentielle.



Substrat — Sandmat Exoterra®, papier ménage, papier journal. Les substrats pouvant être ingérés (sable, terre, ou ceux utilisés pour la cachette humide) présentent un risque d'occlusion intestinale : à utiliser uniquement en respectant certaines précautions.



Équipement

- Branches à grimper
- Plantes naturelles (Phyllostachys, etc.)
- Plusieurs cachettes côté chaud et côté froid
- Cachette humide (sphaigne, vermiculite ou éponge humide) pour faciliter la mue
- Récipient d'eau peu profond, assez grand pour que l'animal puisse s'y baigner
- Brumisation quotidienne



À éviter

- Plaques chauffantes
- Rochers chauffants
- Tapis chauffants à l'intérieur du terrarium
- Lampes trop proches de l'animal et sans protection (risque de brûlures)



Paramètres techniques



Point chaud

30-32 °C



Point froid

20-25 °C

Température nocturne également



Humidité

60-80 %



Éclairage



Photopériode — Cycle 12 h



Besoin UVB — Bénéfiques



Marques recommandées — X-Reptile · Reptile Expert · Solar Raptor · Arcadia

Renouvellement — Tous les 6 mois

Les geckos à crête sont crépusculaires : ils s'exposent donc aussi aux UVB dans leur milieu naturel. Ils sont cependant capables d'absorber le calcium administré en supplément nutritionnel sans rayonnement UVB, à l'inverse des pogonas par exemple. En cas d'apport régulier en calcium, les UVB ne sont donc pas considérés comme vitaux par rapport à d'autres espèces de lézards ; ils restent néanmoins appréciés, améliorent l'absorption du calcium et permettent de reproduire au mieux l'environnement naturel du gecko.

 Les UVB ne traversent ni le verre ni le plexiglas. Placer la lampe à l'intérieur du terrarium, sous grille de protection.

Comportement

Semi-arboricole, nocturne, excellent sauteur. Crépusculaire.

 **Vie sociale** — Solitaire. Mâles ne doivent pas cohabiter. Groupes de femelles possibles avec espace.

 **Cycle d'activité** — Actif la nuit, grimpe et saute.

Enrichissement

- Variété de branches et supports de grimpe
- Chasse d'insectes vivants
- Brumisation quotidienne

Alimentation

Frugivore et Insectivore. Poudre d'aliment complet réhydratée (Repashy, Pangea, Arcadia, Zoo Med, Black Panther Zoological (BPZ), Komodo Complete Diet) ou purées de fruits bio. Les insectes sont proposés 1-2× par semaine maximum.

Régime de base

 **Grillon**

 **Blatte**

 **Crique**

 **Ver de soie**

Fruits

En complément occasionnel si poudre complète utilisée en ration de base. Utiliser en purée lisse, très petites portions, <5-10% de l'apport hebdomadaire.

 **Banane** Ca/P 0.3

 **Mangue** Ca/P 0.5

 **Papaye** Ca/P 0.8

 **Figue** Ca/P 2.1

 **Poire** Ca/P 0.6

 **Melon** Ca/P 0.6 Vit A

 **Myrtille** Ca/P 0.7

 **Framboise** Ca/P 1

 **Goyave** Ca/P 1.1

Compléments

Poudre de calcium à saupoudrer 2-3× par semaine sur l'alimentation.

Nourrir les insectes (gut-load) avec un aliment riche en Ca/vitamines.

Friandises (occasionnelles)

Friandises occasionnelles.

 **Ver de farine**

Très gras, avec modération.

RAPPORT CALCIUM/PHOSPHORE (CA/P)

Indicateur clé de l'équilibre minéral d'un aliment, surtout chez les reptiles : un ratio favorable au calcium soutient le squelette et la carapace. Repères : ≥ 2 = adéquat · $1-2$ = à modérer · < 1 = à éviter (favorise la maladie osseuse). Sur les insectes, une poudre de calcium au repas corrige un ratio défavorable.

À ÉVITER

 **Avocat**
Toxique.

 **Rhubarbe**
Toxique.

 **Carambole**
Toxique.

 **Citron**
Agrume, trop acide.

 **Kiwi**
Excès Vit C.

 **Ananas**
Trop acide.

 **Pamplemousse**
Agrume, trop acide.

 **Orange**
Agrume, trop acide.

 **Raisin**
Trop riche en sucre.



Santé & prévention

Médecine préventive

Ratio Calcium/Phosphore de 2:1 recommandé. Surveillance de l'apport en calcium. Examen annuel.



SIGNES D'ALERTE

- Floppy tail syndrome (queue qui retombe)
- Tremblements (carence calcium)
- Difficultés de mue (dysecdysie)
- Bouche ouverte
- Léthargie
- Ostéodystrophie nutritionnelle

En présence de l'un de ces symptômes, une prise en charge rapide est essentielle. Contactez dès que possible un vétérinaire spécialisé NAC.



Pathologies fréquentes

Ostéodystrophie nutritionnelle

SYMPTÔMES Déformations, tremblements, mâchoire molle

CAUSE Carence en calcium ou rapport Ca/P inadapté

PRÉVENTION Suppléments réguliers, ratio Ca/P > 2:1



Encore plus d'infos sur nacvet.ch

La fiche en ligne est mise à jour régulièrement et propose des contenus enrichis : nouvelles photos, recommandations actualisées, articles de conseil. Scannez ce code pour accéder directement à la version web de cette fiche.



Accédez à la fiche en ligne — nacvet.ch/species/crested-gecko



© 2026 NACVet SA · Tous droits réservés · nacvet.ch — Reproduction et diffusion autorisées à des fins d'information personnelle.