

Furet

Mustela putorius furo

 Ferret
  Frettchen


RÉGLEMENTATION

Animal de compagnie domestique

OPAn: détention sociale recommandée (paires/groupes), espace d'activité quotidien. Certaines communes exigent enregistrement et vaccination rage pour voyages. Chasse/libération interdite.


ESPÉRANCE DE VIE
7-10 ans

POIDS ADULTE
0.6-1.5 kg

MODE DE VIE
Diurne (dort 15-16h/jour)

TEMPÉRATURE CORPORELLE
37.8-40 °C

MATURITÉ SEXUELLE
8-12 mois

GESTATION
39-42 jours

TAILLE DE PORTÉE
1-18


Habitat & environnement


Type — Espace sécurisé (ferret-proof) de min. 4m² pour deux

Substrat — Papier compressé (Yesterday's News®), litière végétale ou litière pour chat (en bac)


Équipement

- Hamacs
- Tunnels ou tuyaux en plastique
- Dodos douillets
- Jouets solides
- Mangeoire
- Biberon ou gamelle lourde



Paramètres techniques


Ambiente

16-25 °C



Éclairage


Photopériode — Limiter à 12 h/jour

Prévention de la maladie surrénalienne.



Comportement

Très social, curieux, joueur et destructeur. Nécessite une éducation pour les morsures.


Vie sociale — Vit très bien en groupe (3-4 idéalement). Tolère chiens et chats. Éviter les proies.

Cycle d'activité — Dort 15-16h/jour. Exploration intense pendant l'éveil.


Enrichissement

- Sorties quotidiennes
- Jeux interactifs
- Environnement ferret-proof
- Chasse au trésor (nourriture)

Alimentation

Carnivore strict et très routinier (il n'aime pas changer de nourriture). Son alimentation doit être riche en protéines animales et en lipides, mais pauvre en sucres, glucides et fibres, en libre-service jour et nuit (transit court de 3-4 h).

Viandes maigres crues, base d'une ration ménagère équilibrée à cuisiner maison (recettes ci-dessous) : prévient de nombreux troubles digestifs et pancréatiques. Le BARF (viandes et carcasses broyées surgelées) est une alternative, en base ou en complément — recette complète obligatoire pour éviter les carences, risque de contamination bactérienne si mal conservé.

Régime de base



Poulet

Viande maigre



Dinde

Viande maigre



Bœuf

Steak haché 15 % de matières grasses

Granulés & compléments

Croquettes spécial furet (>35 % de protéines animales, 20-30 % de lipides). Éviter les croquettes pour chaton (trop riches en glucides, problèmes de santé à long terme). Marques : Totally Ferret®, Supreme Science®, Marshall®.



Granulés

Spécial furet

★ Friandises (occasionnelles)

Proies entières (poussins, rat ou souris surgelés) 1-3/jour ou en friandise ; risque de contamination bactérienne si mal conservées. Friandises occasionnelles (jaune d'œuf, saumon, insecte, jambon...), sans excès.



Poussin



Œuf

Jaune d'œuf



Cou de poulet

Contre le tartre



Raton



Saumon



Souris adulte

Souris



Jambon



À ÉVITER



Sucreries



Chocolat

Ration ménagère : recettes crues pour furet

D'après Dr G. Blanchart, Dr A. Linsart, Dr F. Modesto

Un furet a besoin d'environ 200 calories par jour et par kilo, avec des variations individuelles. Les rations ménagères permettent un contrôle précis des ingrédients mais exigent une rigueur de formulation et d'hygiène pour éviter les déséquilibres (notamment Ca:P, taurine, iode, vitamine E).

Recette poulet (pour 200 calories) : 100 g de viande maigre de poulet ou dinde ; 7,5 ml d'huile de colza ; 0,5 ml d'huile de poisson (1 gélule ouverte sur un repas) ; 3 g (3/4 de dosette) de Vit'i5 Little Ca (poudre, 10 % Ca, vitamines et oligo-éléments, sans P), à malaxer avec la portion journalière de viande

Recette poulet + bœuf gras (pour 200 calories) : 60 g de viande de poulet ou dinde ; 50 g de steak haché de bœuf 15 % de matières grasses ; 5 ml d'huile de colza ; 0,5 ml d'huile de poisson (1 gélule ouverte sur un repas) ; 3 g (3/4 de dosette) de Vit'i5 Little Ca (poudre, 10 % Ca, vitamines et oligo-éléments, sans P), à malaxer avec la portion journalière de viande

Alternatives de compléments

Calcium + vitamines : prémix carnivore sans glucides (ex. Felini Complete), riche en Ca et pauvre en P. Vérifier iode et taurine.

Calcium seul : carbonate/citrate de calcium ou coquille d'œuf ; viser Ca:P ≈ 1,2:1.

Taurine : poudre ou capsules ; 250-500 mg/kg de ration.

Oméga-3 : huile de poisson (EPA + DHA) avec vitamine E.

Préparation : tous les ingrédients peuvent être donnés crus, mais la viande doit être de bonne qualité sanitaire. Mélanger intimement l'huile et la Vit'i5 à la portion journalière de viande ou de poisson ; une demi-pincée de sel (250 mg) peut être ajoutée. Une ration ménagère est une et indivisible : préparer le mélange pour la journée et le conserver au réfrigérateur, puis distribuer de petits repas plusieurs fois par jour. On peut aussi préparer la recette pour une semaine et congeler chaque portion journalière (à décongeler doucement au réfrigérateur).



Santé & prévention



Médecine préventive

Vermifugation : elle dépend du mode de vie du furet. Une vermifugation raisonnée est recommandée, en particulier s'il mange des proies crues, en cas d'accès à l'extérieur, de cohabitation avec des chiens ou des chats, ou d'alimentation à base de viande crue ; la fréquence est à définir avec votre vétérinaire.



Vaccination

Maladie de Carré (très fortement recommandée). Rage (utile si l'animal quitte le pays).



Chirurgie & stérilisation

Stérilisation par implant dès 7 mois. La stérilisation chirurgicale est irréversible, tandis que l'implant est à renouveler périodiquement (4,7 mg : environ 1,5 an en moyenne ; 9,4 mg : environ 2,5 ans). De récentes études montrent l'apparition d'une maladie surrénalienne (tumeur des glandes surrénales) plusieurs années après la chirurgie : l'implant est donc désormais fortement recommandé et la chirurgie à éviter. Si votre furet a été stérilisé chirurgicalement, un contrôle échographique des glandes surrénales est conseillé.



Pathologies fréquentes

Hyperœstrogénisme

SYMPTÔMES Perte de poils, vulve qui reste tuméfiée, démangeaisons excessives et, à terme, destruction de la moelle : la furette devient anémiée et peut mourir rapidement sans traitement adapté.

CAUSE Femelle non saillie restant en chaleurs sans interruption (excès d'œstrogènes).

PRÉVENTION Stérilisation de la femelle non reproductrice (implant recommandé).



SIGNES D'ALERTE

- Perte de poils (queue, flancs)
- Faiblesse des pattes arrière
- Vulve gonflée (femelle)
- Toux

En présence de l'un de ces symptômes, une prise en charge rapide est essentielle. Contactez dès que possible un vétérinaire spécialisé NAC.

Maladie surrénalienne

SYMPTÔMES Perte de poils (queue, flancs), vulve gonflée, faiblesse des pattes arrière.

CAUSE Tumeur des glandes surrénales, favorisée par la stérilisation chirurgicale (en moyenne 3,5 ans après l'opération).

PRÉVENTION Préférer l'implant à la chirurgie ; contrôle échographique des glandes surrénales 3 ans après une stérilisation chirurgicale.



Encore plus d'infos sur nacvet.ch

La fiche en ligne est mise à jour régulièrement et propose des contenus enrichis : nouvelles photos, recommandations actualisées, articles de conseil. Scannez ce code pour accéder directement à la version web de cette fiche.



Accédez à la fiche en ligne — nacvet.ch/species/ferret

