

Cochon d'Inde

Cavia porcellus

🇬🇧 Guinea pig · 🇩🇪 Meerschweinchen



RÉGLEMENTATION

Animal de compagnie domestique

OPAn: détention obligatoire en groupe (au moins 2), dimensions minimales d'enclos, abris. Commerce pro: attestation de compétence. Transport selon OSAV.



ESPÉRANCE DE VIE
5-8 ans



POIDS ADULTE
800-1000 g



MODE DE VIE
Diurne



TEMPÉRATURE CORPORELLE
37.2-39.5 °C



MATURITÉ SEXUELLE
42-70 jours



GESTATION
68-68 jours



TAILLE DE PORTÉE
2-4



Habitat & environnement



Type — Semi-liberté, enclos ou grande cage avec sorties régulières, à l'abri des courants d'air



Substrat — Serviettes, DryBed®/VetBed®, tapis Toftbo®, tapis de yoga ou couverture. Litière végétale : Nullodor® (bois de sapin), chanvre, papier recyclé. Éviter cèdre et pins.



Sorties — Deux heures par jour minimum en intérieur ou enclos extérieur (selon température) pour stimuler le transit et prévenir l'obésité



Équipement

- Cache (maisonnette, carton, tunnel)
- Râtelier à foin
- Mangeoire lourde
- Gamelle lourde pour l'eau (renouveler tous les jours). Eau pauvre en calcaire/calcium : risque de calculs urinaires.



Paramètres techniques



Ambiente

18-24 °C



Comportement

Animal très peureux et facilement stressé.



Vie sociale — Animal grégaire, a besoin de congénères pour vivre sereinement. Attention à l'association entre mâles (bagarres). Ne pas cohabiter avec des lapins (risque de transmission de Bordetella).



Cycle d'activité — Diurne



Enrichissement

- Tunnels
- Exploration sécurisée
- Sorties quotidiennes



Alimentation

Herbivore strict. Foin/herbe à volonté (deux fois le volume de l'animal/jour). Assure l'usure des dents et une bonne digestibilité.



Régime de base



Foin

De fléole, de crau, des montagnes, de céréales. Marques: Oxbow Timothy, Supreme Science



Herbe

Fraîche

Légumes & légumes

100 g/kg/jour, au moins 3 différents par jour. Privilégier les végétaux verts feuillus et les légumes riches en Vitamine C. Attention : Tomate, épinard et fruits riches en Vitamine C à donner en modération (petite quantité), car riches en Calcium et en sucre.

 **Brocoli**
Feuilles

Vit C

 **Fane de betterave**

Vit C

 **Épinard**
Modération (riche en Ca)

Vit C

 **Fane de carotte**

 **Fane de radis**

 **Artichaut**
Feuilles

 **Herbe à chat**

 **Basilic**

 **Bette poirée**

 **Pissenlit**

 **Trèfle**

 **Plantain**

 **Feuille de noisetier**

 **Pimprenelle**

 **Berce**

 **Céleri branche**
Feuille et branche

 **Céleri-rave**

 **Cerfeuil**

 **Chicorée frisée**

 **Endive**

+ 26 autres idées sur nacvet.ch

Granulés & compléments

Marques recommandées : Oxbow · Supreme Science Selective · Beaphar · Versele Laga

Les granulés (uniquement de la forme uniforme — jamais de mélanges de graines / muesli) sont à donner en petite quantité : maximum 20 g/kg de poids corporel par jour. Non indispensables, ils favorisent en excès malocclusion dentaire, surpoids et troubles digestifs : privilégier foin et légumes.

 **Granulés**

Friandises (occasionnelles)

Non essentiels et riches en glucides & sucre. Considérés comme une gourmandise. Peuvent être donnés comme enrichissement, en petite quantité, 1 à 2 fois par semaine.

 **Carotte**

 **Poivron rouge**
Riche en Vitamine C

Vit C

 **Navet**

 **Orange**
Riche en Vitamine C

Vit C

 **Fraise**

 **Pomme**

 **Poire**

 **Tomate**
Modération (riche en Ca/sucre)

Vitamine C

Le cochon d'Inde n'est pas capable de synthétiser la vitamine C (comme l'humain). Pour éviter le scorbut, conséquence d'une carence, la Vit C doit être administrée par voie orale tous les jours. Attention : dégradation rapide dans l'eau de boisson ! En cas de croissance, gestation ou maladie, les besoins sont doublés.

À ÉVITER

 **Soja**

 **Avocat**

 **Chou blanc**

 **Oignon**

 **Ail**

 **Oseille**

 **Pomme de terre**

 **Feuilles de tomate**

 **Poireau**

 **Rhubarbe**

 **Épluchures**

 **Pain**

 **Sucreries**

 **Chocolat**

 **Bâtonnets de céréales**

 **Fruits secs**

Santé & prévention

Médecine préventive

Vermifugation nécessaire si sorties à l'extérieur ou symptômes.
Contrôle annuel recommandé.

Vaccination

Aucune

Chirurgie & stérilisation

SIGNES D'ALERTE

- Arrêt du transit
- Perte d'appétit
- Difficultés respiratoires
- Léthargie

En présence de l'un de ces symptômes, une prise en charge rapide est essentielle. Contactez dès que possible un vétérinaire spécialisé NAC.

Castration (mâle, 4 mois) / Ovariectomie (femelle, 5 mois). Prévient les kystes ovariens.

Pathologies fréquentes

Scorbut

SYMPTÔMES Boiterie, léthargie, perte d'appétit, saignements

CAUSE Carence en Vitamine C

PRÉVENTION Supplémentation quotidienne par voie orale

Kystes ovariens

SYMPTÔMES Très fréquents chez les femelles non stérilisées

PRÉVENTION Ovariectomie conseillée à l'âge de 5 mois

Fusion de la symphyse pubienne

SYMPTÔMES Gros risques lors de la mise-bas tardive

CAUSE Première reproduction après l'âge de 8 mois

PRÉVENTION Mettre à la reproduction entre 5 et 8 mois

Pododermatite

SYMPTÔMES Inflammation sous les pattes

CAUSE Substrat inadapté, humidité, poussière

PRÉVENTION Substrat mouelleux (DryBed), hygiène, exercice

Encore plus d'infos sur nacvet.ch

La fiche en ligne est mise à jour régulièrement et propose des contenus enrichis : nouvelles photos, recommandations actualisées, articles de conseil. Scannez ce code pour accéder directement à la version web de cette fiche.

 [Accédez à la fiche en ligne](https://nacvet.ch/species/guinea-pig) — nacvet.ch/species/guinea-pig



© 2026 NACVet SA · Tous droits réservés · nacvet.ch — Reproduction et diffusion autorisées à des fins d'information personnelle.