

Caméléon casqué du Yémen

Chamaeleo calyptatus

🇬🇧 Veiled chameleon 🇩🇪 Jemenchamäleon

NAC+Vet



RÉGLEMENTATION

CITES Annexe II

Importation/détention soumises à CITES Annexe II: exiger preuve d'origine légale (certificat CITES). Soumis à l'OPAn/TSchV: exigences minimales de détention pour sauriens (annexe 2, reptiles: dimensions minimales de terrarium, UVB, gradients thermiques, humidité). Attestation de compétence recommandée pour reptiles; certains cantons peuvent l'exiger pour la vente/détention. Lâcher interdit; respect des exigences cantonales supplémentaires éventuelles.



ESPÉRANCE DE VIE
5-8 ans



POIDS ADULTE
90-180 g



TAILLE ADULTE
35-60 cm



MODE DE VIE
Diurne



TEMPÉRATURE CORPORELLE
Ectotherme



MATURITÉ SEXUELLE
5-8 mois



INCUBATION
160-220 jours



TAILLE DE PORTÉE
20-60 œufs



Habitat & environnement

Type — Enclos vertical grillagé/mesh fin, fortement ventilé, riche en branches et feuillages

Substrat — Fond nu, alèse absorbante ou bioactif parfaitement drainé (éviter ingestion). Pas de particules libres au sol si femelle sans bac de ponte.

Sorties — Structure verticale riche, renouvellement de branches/feuillages pour exploration; éviter manipulations inutiles (stress).



Équipement

- Nombreuses branches horizontales/obliques (diamètre 1-2x largeur de la main)
- Plantes vivantes non toxiques (Ficus, Schefflera, Pothos) pour couvert et boisson
- Système d'hydratation: brumisation automatique + goutte-à-goutte
- Lampe UVB de qualité (T5 HO) + lampe de basking halogène
- Thermostats/gradateurs, thermomètres sondes en hauteur, hygromètre
- Bac de ponte pour femelles (seau 25-30 cm profondeur, sable/terre humidifiés)



Paramètres techniques



Point chaud

31-33 °C

Température au perchoir de basking sous la lampe



Point froid

22-25 °C

Zone basse/ombragée



Ambiante

24-28 °C

Gradient vertical; éviter les surchauffes > 30 °C ambiant



Humidité

50-70 %

Cycles d'humidité: pics 80-100% pendant/juste après brumisation, retour 50-60% en journée



Éclairage



Photopériode — 11-12 h/jour



Besoin UVB — Indispensables

 **Marques recommandées** — X-Reptile · Reptile Expert · Solar Raptor · Arcadia

 **Renouvellement** — Tous les 6-12 mois selon fabricant

 Les UVB ne traversent ni le verre ni le plexiglas. Placer la lampe à l'intérieur du terrarium, sous grille de protection.

 Les lampes à vapeur métallique sont la référence pour l'apport en UV : spectre UVB puissant, supérieur aux néons et lampes compactes, optimisant la synthèse de vit. D et l'absorption du calcium. Réduisent le risque de maladie osseuse métabolique; lumière visible intense et chaleur homogène stimulant l'activité.

Comportement

Le Caméléon casqué du Yémen est solitaire, territorial et très sensible au stress et à la déshydratation. Il a besoin d'un terrarium fortement ventilé (type grillagé), d'un gradient thermique et UVB de qualité, d'un fort taux d'humidité ambiante avec périodes de séchage, et d'un accès à l'eau sous forme de gouttes/micro-ruissellement plutôt que d'un bol. Manipulations à limiter.

 **Vie sociale** — Solitaire et territorial. Cohabitation déconseillée hors reproduction; risques de stress, anorexie et blessures. Il a besoin d'un aménagement riche en végétation/branches pour le couvert visuel et des zones de retrait.

 **Cycle d'activité** — Diurne. Il a besoin d'un point chaud localisé ~32-35 °C, d'une zone fraîche ~22-26 °C, nuit ~18-22 °C; UVB de haute qualité (UVI cible environ 2-3 en zone d'exposition). Il a besoin d'humidité 50-70 % avec brumisations (matin/soir) et d'un séchage entre les sessions. Hydratation par goutte-à-goutte/nébulisation quotidienne et alimentation variée d'insectes supplémentés Ca et vitamines (D3/UVB adaptés).

Enrichissement

- Plantes vivantes, réseau de branches à divers diamètres
- Pulvérisations simulant rosée/averses
- Variation contrôlée de la photopériode saisonnière
- Alimentation animée (insectes mobiles) dans des bacs d'alimentation sécurisés

Alimentation

Insectivore opportuniste. Proies nourries (gut-load) 24-48 h + poudrage Ca/Vit selon protocole. Hydratation principalement via gouttes sur feuillage.

Régime de base

Grillon

Domestique acheminé en bac nourri Ca/P adéquat

Blatte

Dubia: bonne densité énergétique; tailles adaptées

Criquet

Sauterelle/criquet: riche en fibres chitineuses; variabilité utile

Ver de soie

Bombyx: très digestes, favorables en cas de stomatite légère

Larve de diptère

Larves de mouche soldat noire (BSF): riches en Ca; utiles pour varier

Légumes & légumes

Espèce connue pour consommer occasionnellement des végétaux (feuilles tendres). Offrir parcimonieusement.



Pissenlit

Ca/P 5.2

Vit A

Feuilles de pissenlit: rinçage soigné; source Ca



Roquette

Ca/P 4

Vit A

En petites quantités



Concombre

Ca/P 0.5

Vit A

En morceaux fins pour léchage d'eau



Mâche

Ca/P 2.5

Vit A

En petites quantités



Courgette

Ca/P 0.7

En morceaux fins pour léchage d'eau

★ Friandises (occasionnelles)

Vers de farine/zoophobas en friandises seulement (taux de lipides élevé, rapport Ca/P défavorable).

Ver de farine

Ténébrion (Tenebrio molitor): occasionnel, bien gut-loadé et poudré

Ver Morio

Zophobas/Morio: très occasionnel



Mouche aptère

Stimulation de la prédation

FRÉQUENCE

- Juvéniles (0–6 mois): petites proies quotidiennes (10–15/jour fractionnées)
- Subadultes (6–12 mois): 1 jour sur 2
- Adultes: 3–4 jours/semaine; femelles non gravides à ration modérée pour prévenir obésité et hyperponte

RAPPORT CALCIUM/PHOSPHORE (CA/P)

Indicateur clé de l'équilibre minéral d'un aliment, surtout chez les reptiles : un ratio favorable au calcium soutient le squelette et la carapace. Repères : ≥ 2 = adéquat · 1–2 = à modérer · < 1 = à éviter (favorise la maladie osseuse). Sur les insectes, une poudre de calcium au repas corrige un ratio défavorable.

À ÉVITER

 **Proies sauvages**
Risque pesticides/parasites

 **Aliment transformé**
Aliments humains transformés: inadaptés

Santé & prévention

Médecine préventive

Quarantaine ≥ 60 –90 j, coproscopies sériees, contrôle strict UVB et gradients, calendrier de remplacement des lampes, suivi du poids/BCS, dépistage parasitaire avant introduction.

Vaccination

Aucune vaccination de routine

Chirurgie & stérilisation

Ovariosalpingectomie (dystocie, folliculite), extraction de corps étrangers, soins dentaires/gingivaux (stomatite), retrait d'abcès cutanés.

Pathologies fréquentes

MBD – maladie osseuse métabolique (hypocalcémie secondaire)

SYMPTÔMES Faiblesse, tremblements, membres arqués, mâchoire molle, fractures pathologiques

CAUSE Déficit UVB/D3, Ca alimentaire insuffisant, rapports Ca/P défavorables

PRÉVENTION UVI 2–3 stable au perchoir, suppléments Ca adaptés, gut-loading

Stomatite/infections buccales

SYMPTÔMES Hypersalivation, débris caséeux, halitose, douleur

CAUSE Microtraumatismes, déficits immunitaires, carences, humidité chronique

PRÉVENTION Hygiène, variété d'insectes, UVB/thermorégulation adéquats

Infections respiratoires

SYMPTÔMES Jetage, sifflements, bouche ouverte, anorexie

CAUSE Ventilation insuffisante, sur-humidification sans assèchement diurne, températures inadaptées

PRÉVENTION Enclos grillagé, cycles humidité avec période sèche, contrôle T°

SIGNES D'ALERTE

- Anorexie > 7–10 j chez juvénile ou > 2–3 semaines chez adulte
- Léthargie, maintien en position basse prolongé
- Bave, stomatite, œdème mandibulaire
- Respiration bouche ouverte, sifflements
- Dysecdysis, brûlures thermiques, déshydratation (yeux enfoncés)
- Distension caudale/abdominale chez femelle, ponte retardée

En présence de l'un de ces symptômes, une prise en charge rapide est essentielle. Contactez dès que possible un vétérinaire spécialisé NAC.

Parasitoses (oxyures, coccidies, Strongyloides, Cryptosporidium)

SYMPTÔMES Amaigrissement, diarrhée, intermittence d'appétit

CAUSE Nouveaux individus, proies contaminées, hygiène

PRÉVENTION Quarantaine, coproscopies/flottations, traitements ciblés

Dystocie/folliculite chez femelles

SYMPTÔMES Léthargie, anorexie, distension, ponte absente

CAUSE Absence de bac de ponte, hypocalcémie, déshydratation, stress

PRÉVENTION Bac de ponte permanent chez femelles pubères, statut Ca/UVB optimisé, hydratation

Brûlures thermiques

SYMPTÔMES Plaques érythémateuses/noircies, cloques

CAUSE Contact direct avec ampoules/émetteurs non protégés

PRÉVENTION Grilles de protection, distances correctes, contrôle T° au perchoir

Goutte (hyperuricémie/insuffisance rénale)

SYMPTÔMES Léthargie, tuméfactions articulaires, dépôts blanchâtres

CAUSE Déshydratation chronique, excès protéique, néphrotoxicité

PRÉVENTION Hydratation par brumisation/goutte-à-goutte, cycles humides, eau propre

Encore plus d'infos sur nacvet.ch

La fiche en ligne est mise à jour régulièrement et propose des contenus enrichis : nouvelles photos, recommandations actualisées, articles de conseil. Scannez ce code pour accéder directement à la version web de cette fiche.

 **Accédez à la fiche en ligne** — nacvet.ch/species/veiled-chameleon



© 2026 NACVet SA · Tous droits réservés · nacvet.ch — Reproduction et diffusion autorisées à des fins d'information personnelle.